3° Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιατρικής Φυσικής

27° Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο
Ακτινολογίας

Αδυναμία βάδισης ως πρώτο σύμπτωμα Οπισθοπεριτοναϊκού Λιποσαρκώματος

Δημήτριος Πρίφτης, Αγγελική Παπαδημητρίου, Βικτώρια Τσατσαρέλη, Χριστίνα Ουρουμίδου, Ιωάννης Δαυΐδης, Χρυσή Ναλμπαντίδου

Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

30, 31 ΟΚΤ + 1 ΝΟΕ
2026

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Οργάνωση

ΕΦΙΕ
Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή


- Το λιποσάρκωμα αποτελεί έναν από τους συχνότερους τύπους σαρκωμάτων του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και χαρακτηρίζεται από βραδεία και προοδευτική ανάπτυξη, η οποία επιτρέπει στον όγκο να μεγαλώσει αρκετά πριν προκαλέσει συμπτωματολογία.
- Η ανατομική ιδιαιτερότητα της περιοχής, σε συνδυασμό με την ικανότητα του όγκου να μετατοπίζει ζωτικά όργανα και νευρικές δομές χωρίς να τα διηθεί αρχικά, οδηγεί συχνά σε καθυστερημένη διάγνωση.
- Η αδυναμία βάδισης αποτελεί ασυνήθιστη πρώτη εκδήλωση του όγκου, καθώς τα περισσότερα περιστατικά εκδηλώνονται ως κοιλιακό άλγος ή αίσθημα πληρότητας.

Μέθοδοι & Υλικά

- Γυναίκα 85 ετών προσήλθε επισκέφθηκε νευρολόγο λόγω προοδευτικής αδυναμίας βάδισης από 3μήνου.
- Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ψηλαφητή μάζα στην αριστερή κοιλιακή χώρα και έγινε σύσταση για διερεύνηση με αξονική τομογραφία.
- Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου μετά την από του στόματος χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας καθώς και πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και μελετήθηκαν οι τομές σε εγκάρσια, στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση.

Αποτελέσματα

- Στον αριστερό οπισθοπεριτοναϊκό χώρο διαπιστώθηκε ευμεγέθης ανομοιογενής χωροκατακτητική εξεργασία με πυκνότητες λιπώδους ιστού, κατά κύριο λόγο, καθώς και εμπλουτιζόμενα συμπαγή στοιχεία.
- Η εξεργασία προκαλεί πιεστικά φαινόμενα στις παρακείμενες ανατομικές δομές, και έρχεται σε στενή επαφή με τον παρακείμενο ψοΐτη μυ, χωρίς σαφή διαχωρισμό των μεταξύ τους ορίων.
- Τα απεικονιστικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ μεσεγχυματικής προέλευσης εξεργασίας και πρωτίστως λιποσαρκώματος.
- Η ασθενής οδηγήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου και η ιστολογική εξέταση έδειξε **αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα**.



Συμπεράσματα

- Η αξονική τομογραφία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο πρώτης γραμμής για διερεύνηση περιστατικών με υποψία όγκου οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και έχει την δυνατότητα να βοηθήσει στην τελική διάγνωση του ασθενούς.
- Σε περιπτώσεις όπου η εξεργασία διηθεί νευρικές ή μυϊκές δομές μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω απεικόνιση με MRI.





Βιβλιογραφία

- Mansour S, Azzam N, Kluger Y, Khuri S. Retroperitoneal Liposarcoma: The Giant Type. J Med Cases. 2022 Oct;13(10):517-520. doi: 10.14740/jmc4014. Epub 2022 Oct 31. PMID: 36407863; PMCID: PMC9635766.
- Rachman Y, Hardja Y. Giant retroperitoneal liposarcoma: A case report. Int J Surg Case Rep. 2022 Aug;97:107465. doi: 10.1016/j.ijscr.2022.107465. Epub 2022 Jul 30. PMID: 35917605; PMCID: PMC9403284.
- Lu J, Qin Q, Zhan LL, Yang X, Xu Q, Yu J, Dou LN, Zhang H, Yang Y, Chen XC, Yang YH, Cheng HY, Sun XC. Computed tomography manifestations of histologic subtypes of retroperitoneal liposarcoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(15):6041-6. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.15.6041. PMID: 25124571.