3° Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιατρικής Φυσικής

27° Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο
Ακτινολογίας

Απεικονιστικά ευρήματα CT σε ασθενή με σύνδρομο Ramsey Hunt

Δημήτριος Πρίφτης, Αγγελική Παπαδημητρίου, Βικτώρια Τσατσαρέλη, Χριστίνα Ουρουμίδου, Ιωάννης Δαυΐδης, Χρυσή Ναλμπαντίδου

Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

30, 31 ΟΚΤ + 1 ΝΟΕ
2026

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Οργάνωση

ΕΦΙΕ
Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή

- Το σύνδρομο Ramsay Hunt (RHS) είναι μια κρίση έρπητα ζωστήρα, που εμφανίζεται στο πρόσωπο και επηρεάζει το προσωπικό νεύρο.
- Ονομάζεται μερικές φορές ωτικός έρπης ζωστήρας, λόγω του χαρακτηριστικού εξανθήματος που μοιάζει με ανεμευλογιά και συνήθως εμφανίζεται μέσα και γύρω από τα ώτα.
- Συνήθως προκαλεί ποικίλου βαθμού μονόπλευρη παράλυση ή αδυναμία του προσώπου και απώλεια ακοής.
- Είναι μια σπάνια διαταραχή και συνήθως επηρεάζει άτομα άνω των 60 ετών.
- Περίπου 5 στους 100.000 ανθρώπους αναπτύσσουν RHS κάθε χρόνο.


Μέθοδοι & Υλικά


- Γυναίκα 80 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ ΩΡΛ λόγω εξανθήματος δεξιού ημίσεος προσώπου και αναφερόμενου άλγους στο δεξιό ους από διημέρου. Από ωρών αναφέρει περιοφθαλμικό άλγος δεξιού οφθαλμού.
- Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη φλεγμονή πτερυγίου και έξω ακουστικού πόρου του ΔΕ ωτός και έλκη υποφάρυγγα.
- Ζητήθηκε αξονική τομογραφία εγκεφάλου και σπλαχνικού κρανίου στα πλαίσια του επείγοντος.
- Μετά τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας της ασθενούς, διενεργήθηκε αξονική τομογραφία εγκεφάλου και σπλαχνικού κρανίου πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού και μελετήθηκαν οι τομές σε εγκάρσια, στεφανιαία και οβελιαία ανασύνθεση.

Αποτελέσματα

- Διαπιστώθηκε πάχυνση, εμπλουτισμός και οιδηματώδης απεικόνιση των μαλακών μορίων της ωτικής χώρας δεξιά και πέριξ αυτής, όπου στην περιοχή του έξω ακουστικού πόρου προκαλεί ελάττωση του εύρους αυτού. *(εικόνες 1 και 2)*
- Επίσης διαπιστώθηκε παρουσία υλικού στο μέσο ους δεξιά και υποπλασία μαστοειδών κυψελών αμφοτερόπλευρα. *(εικόνες 3 και 4)*
- Δεν διαπιστώθηκε κάποια οξεία παθολογία από το ενδοκράνιο.
- Τα ευρήματα είναι συμβατά με φλεγμονή και έγινε σύσταση για διενέργεια MRI.









Συμπεράσματα

- Η αξονική τομογραφία, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας MRI για την απεικόνιση των κρανιακών νεύρων, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο πρώτης γραμμής στην διερεύνηση του συνδρόμου Ramsay Hunt, κυρίως:
  - για τον αποκλεισμό άλλων αιτιών ωταλγίας και παράλυσης του προσωπικού νεύρου
  - αξιολόγηση των οστικών δομών και πιθανών επιπλοκών
  - σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν δύναται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία
- Η ενσωμάτωση της αξονικής τομογραφίας σε ένα δομημένο διαγνωστικό πρωτόκολλο μπορεί να επιταχύνει τη διάγνωση και να συμβάλει στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.

Βιβλιογραφία

- Osman HA, Deifa AA, Ali M. Clinical Insights Into Ramsay Hunt Syndrome: A Case Report Highlighting Diagnostic Challenges and Management Considerations. Int Med Case Rep J. 2025 Dec 31;18:1709-1713. doi: 10.2147/IMCRJ.S558967.
- Labin E, Tore H, Alkuwaiti M, Streib C. Teaching Neuro*Images*: Classic Ramsay Hunt syndrome and associated MRI findings. Neurology. 2017 Aug 15;89(7):e79-e80. doi: 10.1212/WNL.0000000000004239.
- Attila A, John S, Okeke R. Clinical Signi□cance of Imaging Modalities in Ramsay Hunt Syndrome Diagnosis. Ann Clin Radiol. 2023; 5(1): 1020.